8 CUIDAR DA NOVILHA

A partir do desmame precoce, que acontece por volta do 56º dia de vida, a novilha ainda permanece na casinha até o 70º dia, quando deve ser solta em um piquete. Os piquetes para novilhas devem ser formados com pasto de boa qualidade e com capim de porte baixo. Capins de porte alto dificultam a pastagem dos animais, pois eles ainda não têm altura suficiente para se alimentarem adequadamente nesse tipo de pastagem. Se houver um grande número de novilhas na propriedade, na medida do possível, elas devem ser separadas em conjuntos do mesmo porte (tamanho), para que não haja competição que possa impedir algumas delas de se alimentarem adequadamente. Neste período, as novilhas devem receber maiores quantidades de concentrado, pois, com a retirada do leite, automaticamente, elas vão aumentar o consumo.

Até os seis meses de vida, as novilhas devem receber dois quilos de concentrado. Uma alimentação volumosa tem que estar disponível à vontade, para que possam se desenvolver plenamente.

A partir dos seis meses, as novilhas devem ser conduzidos para piquetes maiores, onde se desenvolverão até que tenham idade e peso para serem inseminadas. Em todo o período de recria, deve-se utilizar cochos de tamanho adequado, para que todos os animais possam se alimentar sem prejuízo para o seu desenvolvimento. Dentro do manejo estipulado para a categoria das novilhas, elas devem ser submetidas aos vários métodos de prevenção de doenças, como as vacinações e o controle de vermes e ectoparasitos.

